

QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA PER ESAME RILASCIO QUALIFICA DI
"COADIUTORE NELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL CINGHIALE"

Chi ha la diretta responsabilità degli interventi e degli abbattimenti delle attività di controllo di specie di fauna selvatica?

- A Il legale rappresentante dell'Istituto faunistico venatorio in cui si effettuano gli interventi B
La Regione Emilia-Romagna
- C **Le Province e la Città metropolitana di Bologna**

Chi sono tutti i soggetti che a norma di legge possono partecipare agli interventi di controllo di specie di fauna selvatica?

- A I soggetti indicati dall'art.19, comma 2 della legge 157/1992 e smi B
I proprietari del fondo ed i cacciatori di selezione
- C **I soggetti indicati dall'art.19, comma 2 della legge 157/1992 e smi, e gli operatori in possesso della qualifica di coadiutore espressamente autorizzati e coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna**

A chi compete l'approvazione di un piano di controllo di specie di fauna selvatica, fuori dai parchi e dalle riserve naturali?

- A Alle Province territorialmente competenti e alla Città metropolitana di Bologna B
Alla Regione Emilia-Romagna
- C All'ATC territorialmente competente

A chi compete l'approvazione di un piano di controllo di specie di fauna selvatica nei parchi e riserve naturali?

- A Al personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna
- B Alla Regione Emilia-Romagna
- C **All'Ente parco territorialmente interessato**

Chi è il soggetto che autorizza e coordina gli operatori in un piano di controllo, ai sensi dell'art. 16 della L.R.8/1994 e smi?

- A **Il personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna**
- B Il Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca territorialmente competente
- C Il responsabile appositamente nominato delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole o dell'ATC

Il possesso della licenza di caccia in corso di validità è un requisito essenziale richiesto per partecipare agli abbattimenti di controllo:

- A Sì, ma solo nei confronti dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani
- B **Sì, sempre**
- C Sì, ma solo nei confronti delle guardie forestali e delle guardie comunali

Cos'è un piano di controllo di specie di fauna selvatica?

- A È un'attività venatoria nei confronti di specie selvatiche che arrecano danno alle produzioni agricole

- B È una modalità di caccia in deroga
- C È la possibilità di prelievo di specie selvatiche che arrecano danno alle produzioni agricole quando l'utilizzo di metodi ecologici è risultato inefficace.

Chi fra i seguenti soggetti non ha titolo per partecipare agli abbattimenti in attività di controllo?

- A Guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali
- B **Abilitati all'esercizio venatorio ai sensi dell'art.47 della L.R.8/1994 e smi, in possesso di licenza di caccia in corso di validità**
- C proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani, in possesso di licenza di caccia in corso di validità

Che cosa si intende per controllo selettivo?

- A L'eliminazione o la riduzione di una popolazione animale attraverso la caccia di selezione
- B **Le operazioni gestionali atte a ridurre o a controllare il numero di individui di una certa specie con l'utilizzo di tecniche selettive**
- C la verifica periodica dei danni arrecati alle colture agricole dalla selvaggina

A norma dell'art.16 della L.R.8/1994 e smi, la Regione è competente dell'approvazione di un piano di controllo:

- A **Su tutto il territorio, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali**
- B Su tutto il territorio ad eccezione degli istituti privati
- C Su tutto il territorio regionale

A norma dell'art.16 della L.R.8/1994 e smi, quali sono le armi e le munizioni consentite agli operatori cui è affidato lo svolgimento di attività di controllo mediante abbattimento?

- A Armi in dotazione con munizioni di calibro adeguato alla specie da abbattere
- B Armi in dotazione con le munizioni che l'operatore ritiene più appropriate
- C **Armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione**

A chi risponde l'operatore cui è affidato lo svolgimento di attività di controllo?

- A Alla Regione, ed in particolare ai servizi territoriali regionali su cui si attua il controllo
- B Alla Regione se il controllo si effettua all'interno delle zone di protezione della fauna di cui all'art.19 L.R.8/1994 smi, all'ATC se il controllo si effettua in terreno di caccia programmata, alle A.V. se il controllo si effettua su terreno incluso in azienda venatoria
- C **Agli Organi di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna**

Che ruolo svolge chi partecipa ad un piano di controllo?

- A **Di pubblico servizio**
- B Di rilevante interesse ambientale
- C Di interesse privato

Lo smaltimento delle carcasse di fauna selvatica abbattute nell'ambito degli interventi di controllo deve avvenire:

- A **Nelle forme e modalità stabilite dal relativo Piano di controllo ed in conformità con le specifiche normative di settore**
- B Non è necessario lo smaltimento perché la carcassa può essere lasciata sul territorio
- C Alla presenza di un operatore delegato dal servizio veterinario AUSL

Quale attività è fondamentale per redigere un corretto piano di abbattimento in attività di controllo?

- A Contare i cacciatori che vogliono eseguire il piano di abbattimento
- B **Realizzare il censimento della popolazione che si intende prelevare**
- C Avere la disponibilità di fucili

In base alla L. 157/92 ed alla L.R.8/1994 smi, quale soggetto deve esprimere parere su un piano di controllo della fauna?

- A L'ATC
- B Le Associazioni Venatorie
- C **L'ISPRA (ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica)**

In base alla L. 157/92 quali interventi è necessario realizzare prima di attivare un piano di abbattimento di animali che arrecano danni alle produzioni agricole?

- A Risarcire economicamente gli agricoltori
- B Catturare gli animali con le trappole e poi abatterli
- C **Impiegare metodi ecologici, ovvero realizzare interventi di prevenzione dei danni**

Qual è il tiro utile di un fucile a canna liscia caricato con munizioni spezzate?

- A **Massimo 40/50 metri**
- B Circa 150 metri
- C Da 150 a 400 metri a seconda del calibro

Che cosa attribuisce il superamento della prova d'esame di coadiutore ai piani di controllo?

- A **Una idoneità tecnica a svolgere determinate funzioni nell'ambito delle operazioni connesse all'attuazione dei piani di controllo faunistici**
- B L'autorizzazione all'effettivo svolgimento delle funzioni nell'ambito delle operazioni connesse all'attuazione dei piani di controllo faunistici
- C Un obbligo al rilascio dell'autorizzazione a svolgere determinate funzioni nell'ambito delle operazioni connesse all'attuazione dei piani di controllo faunistici

Un piano di controllo approvato dalla Regione può essere realizzato:

- A Su tutto il territorio ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali, rispettando i giorni di silenzio venatorio di martedì e giovedì
- B Su tutto il territorio ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali, nel rispetto degli orari stabiliti dal Calendario venatorio regionale
- C **Su tutto il territorio ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Piano di controllo stesso**

Chi fra i seguenti soggetti non ha titolo per partecipare agli abbattimenti di cinghiale in attività di controllo?

- A Cacciatori abilitati ai sensi dell'ordinamento regionale alla caccia selezione di cinghiale, capriolo, daino e muflone, in possesso di licenza di caccia in corso di validità
- B **Cacciatori di cinghiale abilitati alla caccia collettiva, abilitati ai sensi dell'ordinamento regionale, ed in possesso di licenza di caccia in corso di validità**
- C proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani, in possesso di licenza di caccia in corso di validità

Quale delle seguenti affermazioni, riferite ad un ibrido di cinghiale con bestiame domestico, è sbagliata?

- A Il mantello è quasi sempre monocromatico o al più pezzato
- B Le orecchie sono più lunghe e/o portare piegate
- C **Il profilo fronto-nasale è lungo, aguzzo e rettilineo (o leggermente concavo)**

Relativamente al cinghiale, come viene chiamato il “nido” che la femmina prepara per partorire?

- A Covo
- B **Lestra**
- C Insoglio

Relativamente al cinghiale, a quale segno di presenza si riferisce la seguente definizione: “..sono segni di presenza tipici ...la loro estensione e profondità varia in relazione alla densità di animali, all’umidità del terreno ed al tipo di cibo reperibile...”?

- A **Grufolate**
- B Grattatoi
- C Fatte

A che età si verifica l’eruzione del primo molare (M1) nel cinghiale?

- A A circa 4 mesi
- B **A circa 6 mesi**
- C A circa 10 mesi

Quando l’arma è carica, che cosa occorre fare?

- A Tenere la sicura inserita e il dito nel ponticello del grilletto
- B Tenere l’arma anche senza sicura purché rivolta verso l’alto
- C **Tenere la sicura inserita, disattivandola solo immediatamente prima dello sparo**

Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cinghiale, è corretta?

- A. **Il branco è una struttura matriarcale, la femmina più anziana o più vigorosa ha il ruolo di capobranco e la prole viene accudita in comune**
- B. Il branco è una struttura sociale in cui il maschio più anziano o più vigoroso ha il ruolo di capobranco
- C. Il branco è una struttura matriarcale, la femmina più anziana o più vigorosa ha il ruolo di capobranco e ogni femmina accudisce la propria prole

Quali denti, della dentatura del cinghiale, corrispondono alla seguente descrizione: “..sono ben sviluppati; quelli inferiori, a forma di scalpello, vengono usati per estrarre gli alimenti dal terreno durante le operazioni di scavo”?

- A **Gli incisivi**
- B I canini
- C I premolari

Fino a che età i maschi di cinghiale restano nel gruppo familiare?

- A Fino a circa 12 mesi
- B **Fino a circa 18 mesi**
- C Fino a circa 24 mesi

Quale metodologia di censimento può essere utilizzata nei censimenti di cinghiale al fine di integrare il censimento delle impronte (soprattutto per ottenere dati sulla struttura di

popolazione) con l'ausilio di governe? **A** Il censimento per indici di abbondanza **B** Il censimento in battuta

C Il censimento a vista da punti vantaggiosi

Quale delle seguenti affermazioni, riferite ad un ibrido di cinghiale con bestiame domestico, è corretta?

A Il mantello è quasi sempre monocromatico o al più pezzato **B**

Le orecchie sono piuttosto corte e portate diritte

C Il profilo fronto-nasale è lungo, aguzzo e rettilineo (o leggermente concavo)

Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle preferenze ambientali del cinghiale, è corretta?

A Molto importante la presenza di prati, coltivi e frutteti

B Predilige boschi puri e misti di latifoglie produttrici di frutta

C Non è sensibile al disturbo di cani vaganti

Quante sono le tecniche di caccia al cinghiale in forma collettiva in Emilia-Romagna? **A**

2, la girata e la braccata

B 3, la selezione, la girata e la braccata

C 3, la girata, la battura e la braccata

Fra le varie tecniche di caccia al cinghiale in Emilia-Romagna, qual è la meno impattante per l'ambiente? **A** la braccata

B la girata

C la battuta

Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle preferenze ambientali del cinghiale, è corretta? **A** Molto importante la presenza di prati, coltivi e frutteti. **B** Predilige boschi puri e misti di latifoglie produttrici di frutta **C** Non è sensibile al disturbo di cani vaganti.

Quale delle seguenti affermazioni, riferita all'alimentazione del cinghiale, è sbagliata?

A In inverno il cibo è costituito principalmente da frutta e semi, secondariamente da Erbe. **B**

In inverno nell'alimentazione non compaiono gli insetti.

C In inverno il cibo principale è costituito da radici e tuberi.

Rispetto alla classificazione sistematica, a quale Ordine appartiene il Cinghiale? **A**

Perissodattili

B Artiodattili

C Onnivori

Per convenzione, quale età ha un cinghiale adulto?

A Più di 1 anno

B Più di 2 anni

C Meno di 3 anni

Quali sono i caratteri che permettono di riconoscere in natura una femmina adulta di cinghiale?

A La forma del grifo e la schiena "gobbosa"

B I capezzoli tirati, profilo del muso (fronto-nasale) leggermente concavo

C la lunghezza della coda, le dimensioni degli speroni e i canini sporgenti

Quale è di norma l'incremento utile annuo (IUA) di una popolazione di cinghiale?

- A 30-50% B
- 50-90%
- C 90-180%

Lo stomaco del Cinghiale è composto:

- A Da 1 camera, perché non è un ruminante
- B Da 2 camere, perché è ruminante
- C Da 4 camere, perché è un Ungulato

Come vengono chiamati i cinghiali di pochi mesi d'età?

- A Cuccioli B
- Verri
- C Striati

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- A La femmina di Cinghiale può essere riproduttiva già a partire da 10-11 mesi d'età
- B La femmina di Cinghiale può partorire soltanto in primavera
- C La femmina di Cinghiale partorisce sempre solo una volta all'anno

Il Cinghiale può mangiare animali? A

- No, perché è un erbivoro
- B Sì, ma solo quando li trova morti
- C Sì, sia predati che carogne

A livello di struttura sociale, nei branchi di cinghiale esiste un soggetto dominante?

- A Sì, nei branchi di femmine e giovani vi è una femmina dominante
- B Sì, nei gruppi familiari di cinghiale comanda il maschio adulto C No, non vi sono livelli gerarchici nei gruppi di cinghiali

Quanto dura la gestazione (gravidanza) nel Cinghiale?

- A Da 60 a 70 giorni
- B Da 16 a 18 settimane
- C Da 6 a 7 mesi

Quale dei seguenti metodi è idoneo per il censimento della popolazione di cinghiale?

- A Censimento delle cucciolate
- B Censimento con richiami registrati
- C Censimento in battuta

Quali tecniche di prevenzione possono contenere i danni in agricoltura prodotti dal cinghiale?

- A Recinzioni fisse o elettrificate, repellenti chimici o acustici
- B Trappolaggio e Abbattimento selettivo
- C Creazione di pozze d'acqua e foraggiamenti in campo aperto

Quale tra i seguenti tiri garantisce la maggior sicurezza per le persone durante il prelievo di cinghiale?

- A Sparare ad un cinghiale che si muove su un crinale di un rilievo
- B Sparare nella macchia quando si vedono muovere i rami

- C Sparare ad un cinghiale che si muove in un terreno piano ad una quota inferiore al punto di sparo

Quali dei seguenti danni possono essere causati dal Cinghiale?

- A Esondazioni per frana degli argini dei fiumi, riduzione del rinnovamento del bosco
B **Innesco di fenomeni erosivi dei suoli, riduzione della produzione agricola** C
Incidenti nelle autostrade, riduzione della produzione di frutta

Le recinzioni elettrificate per la prevenzione dei danni da cinghiale sono efficaci?

- A No, perché i cinghiali con il loro pelo fitto non sentono la scossa
B Sì, ma per un breve periodo perché poi i cinghiali imparano a passare tra i fili elettrificati C
Si, se viene fatta manutenzione che eviti il contatto dei fili elettrificati con la vegetazione In base ad un corretto piano di prelievo del cinghiale, quale percentuale di maschi e di femmine deve essere prelevata per conservare la popolazione?
A **50% maschi e 50% femmine**
B 60% maschi e 40% femmine
C 70% maschi e 30% femmine

Il nome scientifico del Cinghiale è:

- A Sus maialis B
Sus scrofa
C Sus cinghialis

Per convenzione, quale età ha un cinghiale subadulto?

- A Compresa tra 3 e 12 mesi
B **Compresa tra 12 e 23 mesi**
C Compresa tra 15 e 30 mesi

Quali sono i caratteri che permettono di riconoscere in natura un maschio adulto di cinghiale?

- A La forma del grifo, le mammelle non tirate, la presenza del “pennello”
B **la presenza del “pennello”, i canini sporgenti e la forma del corpo**
C la lunghezza della coda, le dimensioni degli speroni e i canini sporgenti

Tra i seguenti fattori, quali possono limitare significativamente l’incremento di una popolazione di cinghiale?

- A La predazione da Lupo, ma anche la competizione con il capriolo
B **Prevalentemente la caccia, ma anche fattori climatici avversi** C
Prevalentemente le malattie, ma anche la caccia

Di norma, quale è il peso di un maschio adulto di Cinghiale del nostro Appennino?

- A Tra 30 e 60 Kg
B **Tra 60 e 100 kg**
C Tra 100 e 160 Kg

Osservando lo stato di crescita dei denti della mandibola di un cinghiale, se è completamente spuntato il terzo molare, possiamo asserire che quel soggetto aveva:

- A meno di due anni di età
B meno di tre anni di età
C **più di tre anni di età**

Come varia di norma il colore del mantello del Cinghiale rispetto all'età?

- A È pezzato nei giovani, poi rosso fino a 2 anni di età e quindi nero
- B È a strisce chiare e scure fino a circa 4 mesi di età, poi rossastro con tendenza a scurirsi con l'incremento dell'età
- C È a strisce chiare e scure fino a circa 11 mesi di età, poi rossiccio fino a 2 anni e nero negli adulti

Quali sono i tre raggruppamenti sociali tipici del Cinghiale?

- A Branchi di femmine con i figli, gruppi di subadulti e maschi adulti isolati
- B Branchi di maschi adulti, branchi di giovani e gruppi di femmine isolate
- C Gruppi familiari con un maschio qualche femmina e i figli, gruppi di cinghiali subadulti

Quanti figli partorisce di norma una femmina adulta di Cinghiale?

- A Da 2 a 4 B Da 4 a 6
- C Da 6 a 9

Quale dei seguenti metodi è idoneo per il censimento della popolazione di cinghiale?

- A Censimento delle tane
- B Censimento all'ascolto
- C Osservazione diretta da punti di vantaggio

Cosa è fondamentale conoscere per redigere un corretto piano di abbattimento?

- A Il numero di cacciatori che realizzano il prelievo
- B Il numero di cinghiali presenti nell'area di prelievo, ripartiti per classi di età e di sesso C Le caratteristiche ambientali dell'area di prelievo

Cosa si intende per DAF (Densità Agro Forestale) riferita a cinghiale?

- A La densità massima di cinghiali che può essere tollerata in una determinata area affinché gli eventuali danni prodotti dalla specie possano essere sostenibili B Il numero di cinghiali presenti nelle aree coltivate e nei boschi
- C La densità di abbattimento dei cinghiali nelle aree agro-forestali

Quali sono i limiti di efficacia dei repellenti acustici per il cinghiale?

- A Sono soggetti a frequenti malfunzionamenti
- B Possono essere efficaci per un massimo di 1 anno, se lasciati sempre nello stesso posto C I cinghiali si abituano velocemente al disturbo causato dal rumore, che quindi non viene più percepito come possibile pericolo

In base ad un corretto piano di prelievo del cinghiale, di norma quale percentuale di giovani deve essere prelevata per mantenere stabile la struttura di popolazione?

- A 20-30% B 40-50%
- C 60-70%

Come viene chiamato il cane utilizzato nella caccia alla girata ?

- A Segugio B Linciere

C Giriere

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A La caccia in battuta/braccata/girata prevede la determinazione quantitativa dell'entità del prelievo.

C La caccia di selezione prevede la determinazione qualitativa dell'entità del prelievo.

D La caccia programmata prevede la determinazione qualitativa dell'entità del prelievo.

In una popolazione di cinghiale quale classe sociale viene identificata dalla seguente descrizione: “..Testa triangolare, larga alla base e con la parte terminale del profilo frontonasale del cranio leggermente convessa; coda che in movimento è generalmente portata orizzontale..”

A I maschi in generale

B I maschi subadulti

C Le femmine in generale

Di quanto cresce mediamente all'anno il peso di un cinghiale? A

circa 5-10 kg

B circa 10-15 kg. C

circa 20-30 kg.

Quale tipo di caccia al cinghiale viene individuato dalla seguente definizione “...È un sistema impiegato con relativa frequenza nei paesi d’Oltralpe e dell’Est europeo ma ancora poco diffuso in Italia; risulta particolarmente adatto in parcelle boschive di limitata estensione, circondate da aree aperte o coltivi”.

A Caccia individuale B

Caccia in battuta

C Caccia alla girata

Quali elementi determinano, o perlomeno favoriscono, la buona riuscita del censimento delle impronte?

A Pochi centimetri di spessore della neve o del fango, tempestività di intervento

B Assenza di neve o fango, operazioni molto capillari

C Diversi centimetri di spessore della neve o del fango, operazioni svolte dopo alcuni giorni

Relativamente al cinghiale, a quale segno di presenza si riferisce la seguente definizione:

“..legati all’attività di alimentazione, sono costituiti in prevalenza da residui delle parti più coriacee dei cereali in fase di maturazione che il cinghiale mastica ma non ingerisce e che si ritrovano sul terreno in masse compatte e allungate...” A Materiale di risulta delle

grufolate. B Escrementi decomposti

C Boli alimentari

Quale delle seguenti affermazioni, riferita alle orme del cinghiale, è corretta? A

La forma dell’impronta si presenta ovalizzata, con le punte sempre divaricate

B La forma dell’impronta si presenta rettangolare, con le punte sempre divaricate **C** La forma dell’impronta si presenta trapezoidale con gli speroni sempre marcati

Nell’avvicinamento verso il cinghiale colpito, che cosa non si deve neanche momentaneamente abbandonare? A Il binocolo **B** Il coltello

C Il fucile

Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cinghiale, è corretta?

- A **La muta dal mantello invernale a quello estivo è molto vistosa; la sostituzione del pelo inizia da spalle e cosce**
- B La muta dal mantello invernale a quello estivo è molto vistosa la sostituzione del pelo inizia da dorso e ventre
- C La muta dal mantello invernale a quello estivo è poco vistosa

Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cinghiale, è corretta?

- A La pelle è piuttosto povera di ghiandole sudorifere e ricca di ghiandole sebacee
- B La pelle è ricca di ghiandole sudorifere e piuttosto povera di ghiandole sebacee
- C **La pelle è piuttosto povera di ghiandole sudorifere e sebacee**

In annate normali (una gestazione), quale evento biologico caratterizza il periodo fine aprile - inizio maggio riferito alle femmine di cinghiale?

- A **Le nascite**
- B La gestazione
- C Il corteggiamento

In che periodo avviene la muta del mantello da invernale a estivo nel cinghiale?

- A Fine febbraio - marzo
- B Fine marzo - aprile
- C **Fine aprile - maggio**

Qual è la densità agro-forestale media del cinghiale in ambienti con scarsa quantità e scarso pregio di colture agro-forestali? A Da 0 a 1 capo su 100 ettari B **Da 5 a 6 capi su 100 ettari** C Da 2 a 4 capi su 100 ettari

A quali ghiandole odorifere del cinghiale si riferisce la seguente descrizione: “..svolge la funzione di lubrificazione durante i “lavori di scavo”

- A Alle ghiandole metatarsali
- B **Alle ghiandole rostrali**
- C Alle ghiandole carpalì

Quanti sono i premolari nella emimandibola di un cinghiale adulto?

- A **4**
- B 6
- C 2

Il censimento delle impronte si applica prevalentemente al cinghiale perché:

- A **È una specie di cui sono facilmente determinabili le impronte**
- B È una specie di abitudini gregarie
- C È una specie di abitudini solitarie

Quale delle seguenti affermazioni, riferite al cinghiale è corretta?

- A La testa è piuttosto piccola ed occupa circa un quinto della lunghezza del corpo
- B **La testa è grande ed occupa circa un terzo della lunghezza del corpo**
- C La testa è grande ed occupa circa metà della lunghezza del corpo

In condizioni normali quale categoria alimentare rappresenta circa il 50% dell'alimentazione autunno-invernale del cinghiale?

- A Erbe (anche coltivi)
- B **Frutta e semi**
- C Carogne, topi, vermi e insetti

Quale fra i seguenti fattori che determinano elevate entità di danneggiamento alle colture da parte del cinghiale, è meno importante?

- A Destutturazione sociale B
Densità molto elevate
- C **Annate straordinarie con doppia gestazione**

Che tipologia di censimento viene individuata dalla definizione: “conteggio degli animali presenti su una porzione dell’area indagata”? A **Censimenti campione**

- B Censimenti completi
- C Censimenti per indice relativo

Gli ungulati dal punto di vista sistematico sono raggruppati in un:

- A Ordine
- B Genere
- C **Superordine**

Quale dei seguenti elementi, da valutare nell’assegnazione delle poste, è privo di importanza?

- A La visibilità
- B **L’orientamento rispetto al sole**
- C Il tipo di arma

Quale delle seguenti affermazioni, riferita al cinghiale, è corretta?

- A **Le necessità vitali sono: acqua, nutrimento e copertura**
- B Le necessità vitali sono: copertura e aree assolate
- C Le necessità vitali sono: nutrimento e presenza di attività agricole

A dentatura completata, quanti denti ci sono nella emimandibola di un cinghiale?

- A 10
- B 12
- C **11**

A quale dei seguenti elementi di valutazione nell’assegnazione delle poste si riferisce: “.....Il campo di tiro deve essere ben definito, spiegato e percepito dal cacciatore....” A **La sicurezza** B

- La visibilità
- C La direzione del vento

Qual è la densità agro-forestale media del cinghiale in ambienti con elevata quantità e/o pregio di colture agro-forestali? A **Da 0 a 1 capo su 100 ettari**

- B Da 1 a 3 capi su 100 ettari
- C Da 5 a 6 capi su 100 ettari

Qual è la densità biotica media del cinghiale in ambienti di qualità scadente?

- A 0,5 - 1 capo su 100 ettari B **3 - 5**
- capi su 100 ettari** C 6 - 15 capi su 100 ettari

Quale delle seguenti affermazioni, riferite al cinghiale, è corretta? A

Nella mascella ci sono 6 molari, 8 premolari, 2 canini, 6 incisivi

- B Nella mascella ci sono 6 molari, 6 premolari, 2 canini, 6 incisivi
C Nella mascella ci sono 6 molari, 4 premolari, 2 canini, 6 incisivi

In quale dei seguenti metodi di caccia non è possibile effettuare la scelta preventiva del capo da abbattere? A Caccia alla cerca

- B Caccia in braccata**
C Caccia all'aspetto

A quale segno di presenza si riferisce la seguente affermazione: "...il cinghiale vi si reca abitualmente...la sua funzione principale è quella di inglobare nel fango i parassiti per poi eliminarli"? A Grufolate

- B Insogli**
C Grattatoi

Quale delle seguenti tipologie di foraggiamento complementare rivolto al cinghiale viene individuata dalla seguente affermazione: "Vengono seminate (in piccoli appezzamenti marginali) colture "a perdere" destinate al cinghiale"?

- A Foraggiamento complementare seminaturale**
B Foraggiamento supplementare
C Foraggiamento complementare totalmente naturale

Come vengono anche chiamati gli speroni del cinghiale in "gergo venatorio"? A

Guardie

- B Difese
C Coti

Cosa indica la definizione: "Operazioni che consentono di ottenere una sufficiente conoscenza dei valori di densità, struttura e dinamica che caratterizzano una determinata popolazione animale"?

- A Caccia programmata
B Censimenti faunistici
C Operazioni di riqualificazione faunistica

Quali denti della dentatura del cinghiale corrispondono alla seguente descrizione: "Sono grandi e sporgenti, quelli superiori sono ripiegati verso l'esterno e verso l'alto"? A I premolari B I canini

- C Gli incisivi